

N.º 10

Valoración de los efectos secundarios de la vacunación de la gripe A (VGA) y de la gripe estacional (VGE) 2009-2010

P. Peña García (ponente). Corporació Parc Taulí. Sabadell

M. V. López Clemente. Corporació Parc Taulí. Sabadell

R. Serrano Fuentes. Corporació Parc Taulí. Sabadell

A. Mariné Torrent. Corporació Parc Taulí. Sabadell

Introducción: la CPT es un hospital universitario en el que, actualmente, trabajan más de 3.400 profesionales a los que en el cuarto trimestre de cada año se les ofrece la vacuna contra la gripe.

Descripción: a pesar de las recomendaciones, la cobertura en las instituciones sanitarias es de un 25%, aun conociendo que la vacuna protege en un 80% de los casos y que los efectos secundarios son pocos y tolerables. El año 2009 ha tenido unas características especiales, ya que debido a la pandemia de gripe A hemos tenido dos fases de vacunación.

Objetivos: conocer los efectos secundarios de la VGA y de la VGE a través de un cuestionario que recoge información sobre los efectos secundarios, su duración, momento de aparición y repercusión sobre las actividades cotidianas.

Metodología: el cuestionario se entrega en el momento de la administración de la vacuna y se solicita que pasados cuatro días se conteste y envíe a SL. El cuestionario pregunta: datos personales y ocho preguntas de respuesta rápida "sí" o "no" respecto a reacciones, duración de los síntomas, interferencias y periodo posterior a la vacuna en que se han presentado.

Resultados: durante la campaña 2009, se administraron 537 dosis de VGE, recibimos 228 cuestionarios contestados y 192 dosis VGA, y se recibieron 107 cuestionarios contestados. Las reacciones locales han sido muy superiores en la VGA respecto a la VGE y la interferencia en la actividad cotidiana no muestra diferencias. Las reacciones generales han sido superiores en la VGA que en la VGE, así como la duración de los síntomas.

Conclusiones: los profesionales VGA contestaron el cuestionario en mayor porcentaje que los VGE. Las reacciones locales como la generales han sido tres veces superiores en los VGA respecto a los VGE. Un 36% de profesionales que no se habían vacunado anteriormente de la VGE se han vacunado de la VGA.

Palabras clave: vacunación gripe A, gripe estacional, efectos secundarios.