

N.º 6

Impacto de la introducción de alitretinoína oral en los costes del eczema severo de las manos de origen profesional desde la perspectiva de las mutuas laborales

José Manuel Mascaró. Dermatólogo, Hospital Clínic. Barcelona

Ignacio Querol. Dermatólogo, MAZ. Zaragoza

Jaime Oliver (ponente). Basilea. Madrid

Leandro Lindner. IMS. Barcelona

Introducción: las afecciones dermatológicas son la segunda causa más frecuente de enfermedad profesional en España. En particular, el eczema severo de las manos de origen profesional (EMOP) es especialmente difícil de tratar y tiene una alta prevalencia entre algunas profesiones como peluquería, construcción y personal sanitario.

Descripción: recientemente, ha sido aprobada en España la alitretinoína oral, el primer tratamiento específico para pacientes con eczema crónico severo de las manos (ECM) refractario a corticoides.

Objetivos: estimar el impacto de la introducción de alitretinoína oral en los costes del EMOP en pacientes refractarios a corticoides desde la óptica de las mutuas laborales.

Metodología: se ha diseñado un modelo de análisis de decisión para estimar los costes asociados al ECM severo con la introducción de alitretinoína oral. La información clínica se ha obtenido de dos ensayos clínicos. La estimación de los recursos se obtuvo en un cuestionario aplicado a un grupo de expertos. La información de los costes asociados a incapacidades ha sido proporcionada por dos mutuas en España.

Resultados: el coste anual del EMOP en el tratamiento actual fue estimado en 42.622 € por paciente. La introducción de alitretinoína oral podría evitar costes por valor de 13.660 € por paciente y año. La incapacidad permanente total es el factor con mayor impacto en los costes.

Conclusiones: la incapacidad es el principal elemento en los costes de pacientes con EMOP desde la perspectiva de las mutuas en España. Los costes indirectos corresponden a un 98% de los costes totales de la enfermedad. Una terapia efectiva para el EMOP puede reducir significativamente el número de pacientes con incapacidades.